



4250121301

4250-1213-01

# Cardomec<sup>®</sup>

(ivermectina/pirantel) **Plus**

## Tabletes mastigáveis

### Uso Veterinário

#### FÓRMULA:

##### Cartela azul:

Ivermectina 68 mcg/Pirantel 59 mg na forma de pamoato.

##### Cartela verde:

Ivermectina 136 mcg/Pirantel 115 mg na forma de pamoato.

##### Cartela marrom:

Ivermectina 272 mcg/Pirantel 229 mg na forma de pamoato.

**INDICAÇÕES:** para uso em cães na prevenção da Dirofilariose canina, eliminando os estágios tissulares da larva do verme do coração (*Dirofilaria immitis*), até 30 dias após a infecção e como tratamento e controle de ascarídeos (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*) e ancilóstomas (*Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma brasiliense*, *Uncinaria stenocephala*).

#### POSOLOGIA:

Cardomec<sup>®</sup> Plus deve ser administrado por via oral, na dosagem mínima recomendada de 6 mcg de ivermectina e 5 mg de pirantel (como sal de pamoato), por quilograma de peso corporal, em intervalos mensais (Veja ADMINISTRAÇÃO). O programa recomendado de dosagem para prevenção da Dirofilariose canina e para o tratamento e controle de ascarídeos e ancilóstomas é como segue:

Cardomec<sup>®</sup> Plus é recomendado para cães com 6 semanas de idade ou mais.

Para cães acima de 45 kg, administrar a combinação apropriada dos tabletes acima relacionados.

Peso do cão em kg	Tabletes/mês	Conteúdo de ivermectina	Conteúdo de pirantel	Cor da Barra da cartela
Até 11	1	68 mcg	59 mg	azul
12 a 22	1	136 mcg	115 mg	verde
23 a 45	1	272 mcg	229 mg	marrom

**ADMINISTRAÇÃO:** remover apenas um tablete mastigável de cada vez. Guardar a embalagem com os tabletes restantes dentro do estojo, para protegê-los da luz. Uma vez que a maioria dos cães acha palatáveis os tabletes mastigáveis de Cardomec<sup>®</sup> Plus, os mesmos podem ser dados na mão ao cão ou intactos com o alimento. O tablete mastigável deve ser administrado ao cão de forma a encorajá-lo a mastigar ao invés de engoli-lo inteiro.

Certificar-se de que o animal consumiu a dose completa, observando-o durante alguns minutos após a administração, para assegurar que não se perdeu parte da dose ou que o tablete foi rejeitado. Por esta razão, se o tablete mastigável de Cardomec<sup>®</sup> Plus for administrado com o alimento do cão, deve estar intacto e não partido. Caso suspeite-se que parte da dose foi perdida, recomenda-se nova dosagem.

Cardomec<sup>®</sup> Plus deve ser administrado em intervalos mensais, durante todo o ano. Ao substituir outro produto para dirofilariose em um programa preventivo, a primeira dose de Cardomec<sup>®</sup> Plus deverá ser dada dentro de 30 dias após a suspensão do tratamento anterior. Se o intervalo entre as doses exceder 30 dias, a eficácia do Cardomec<sup>®</sup> Plus ficará reduzida. Portanto, para obter uma ótima performance, Cardomec<sup>®</sup> Plus deverá ser ministrado uma vez por mês, sempre na mesma data, se possível. Se o tratamento atrasar alguns ou vários dias, a imediata aplicação de Cardomec<sup>®</sup> Plus e o reinício do regime de dosagem recomendado diminuirão as oportunidades de desenvolvimento dos vermes adultos no coração.

O tratamento mensal com Cardomec<sup>®</sup> Plus (ivermectina/pirantel), fornece também um tratamento e controle eficaz dos ascarídeos (*T. canis* e *T. leonina*) e ancilóstomas (*A. caninum*, *A. brasiliense*, *U. stenocephala*). Os usuários devem ser aconselhados sobre as medidas a serem tomadas para prevenir reinfecção com parasitas intestinais.

**EFICÁCIA:** Cardomec<sup>®</sup> Plus, quando administrado oralmente na dosagem e intervalos recomendados, é eficaz contra os estágios larvais tissulares da *Dirofilaria immitis* até um mês após a infecção e, como resultado, previne o desenvolvimento das formas adultas.

Cardomec<sup>®</sup> Plus, é também eficaz contra os ascarídeos (*T. canis* e *T. leonina*) e ancilóstomas (*A. caninum*, *A. brasiliense*, *U. stenocephala*).

**ACEITABILIDADE:** comprovou-se em diversos estudos, que a maioria dos cães consome os tabletes mastigáveis de Cardomec<sup>®</sup> Plus na primeira oferta.

**PRECAUÇÕES:** Todos os cães devem ser submetidos ao teste laboratorial para detecção da Dirofilariose canina antes do início do tratamento com Cardomec<sup>®</sup> Plus. Cães já infectados devem receber tratamentos específicos para remover os vermes adultos antes de iniciar o programa preventivo com Cardomec<sup>®</sup> Plus.

Cardomec<sup>®</sup> Plus não é eficaz contra as formas adultas da *Dirofilaria immitis*. Embora algumas microfíliarias possam ser mortas pela ação de Cardomec<sup>®</sup> Plus, o produto não é eficaz na eliminação das mesmas. Uma discreta reação do tipo hipersensibilidade, presumivelmente devido às microfíliarias mortas ou quase mortas, particularmente envolvendo diarreia transitória, tem sido observada em estudos clínicos com ivermectina, após o tratamento de alguns cães com microfíliarêmia.

#### Manter fora do alcance de crianças.

No caso de ingestão do medicamento por seres humanos, entrar imediatamente em contato com um médico. Os médicos podem se comunicar com um Centro de Controle Toxicológico, para orientação específica sobre a ingestão da ivermectina.

#### Mantenha em temperatura ambiente entre 15°C - 30°C.

**REAÇÕES ADVERSAS:** Em estudos clínicos com Cardomec<sup>®</sup> Plus, foram observados vômito e diarreia raramente (1,1% das doses administradas) dentro de 24 horas após administração. As seguintes reações adversas foram observadas após o uso de Cardomec<sup>®</sup> Plus: depressão/ letargia, vômito, anorexia, diarreia, midríase, ataxia, tremores, convulsões e hipersalivação.

**SEGURANÇA:** Cardomec<sup>®</sup> Plus demonstrou uma ampla margem de segurança no nível recomendado da dosagem em cães, incluindo fêmeas em gestação ou em acasalamento, machos reprodutores e filhotes com mais de seis semanas de idade.

Uma ampla margem de segurança foi também demonstrada em estudos clínicos com Cardomec<sup>®</sup> Plus em programas preventivos contra Dirofilariose canina, quando os cães foram submetidos a tratamentos simultâneos com colares contra pulga, banhos, shampoos, antelmínticos, vacinas e preparados à base de esteróides.

Em um experimento onde os filhotes tiveram Parvovirose, houve uma redução mínima na eficácia contra nematódeos, possivelmente devido à mudança no tempo do trânsito intestinal.

**APRESENTAÇÃO:** Cardomec<sup>®</sup> Plus, está disponível no mercado em três tipos de tabletes (ver POSOLOGIA) para cães de diferentes pesos. Cada concentração é apresentada em cartuchos com 3 ou 6 tabletes mastigáveis.

Data do vencimento : 2 (dois) anos após a data da fabricação.

Venda sob prescrição do médico veterinário.

Proprietário: Merial USA

Fabricante:

Merck Sharp & Dohme Química de Puerto Rico, Inc.  
 Barceloneta, Puerto Rico - U.S.A.

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Merial Saúde Animal Ltda.

Fazenda São Francisco-Paulínia-SP

CNPJ57.600.249/0001-55- Indústria Brasileira

Resp. técnica: Dr. Emilio C. Salani - CRMV-SP nº 3085



Produto Importado

@Cardomec é marca registrada de Merial.

Todos os direitos reservados.

